

# ACIDENTE DE TRABALHO COM MATERIAL BIOLÓGICO

	PACIENTE FONTE	ACIDENTADO (FUNCIONÁRIO)	CONDUTAS
HIV	POSITIVO	NEGATIVO	INICIAR PROFILAXIA IMEDIATAMENTE (*TEMPO OURO – 2 HORAS APÓS ACIDENTE). ENCAMINHAR AO CTA PARA AVALIAÇÃO COM INFECTOLOGISTA E ACOMPANHAMENTO
	NEGATIVO	POSITIVO	NÃO REALIZAR PROFILAXIA. ENCAMINHAR AO CTA PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL.
HEP C	POSITIVO	NEGATIVO	NÃO EXISTE PROFILAXIA. ENCAMINHAR AO CTA PARA AVALIAÇÃO COM INFECTOLOGISTA E ACOMPANHAMENTO
	NEGATIVO	POSITIVO	ENCAMINHAR AO CTA PARA AVALIAÇÃO COM INFECTOLOGISTA E ACOMPANHAMENTO
HEPATITE B	POSITIVO	NEGATIVO	AVALIAR IMUNIDADE VACINAL DO ACIDENTADO. SE VACINADO COM ANTI-HBS REAGENTE, NÃO TOMAR NENHUMA CONDUTA (IMUNE). SE O ACIDENTADO POSSUIR ANTI-HBS NÃO REAGENTE, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE DOSES DE VACINA, DEVERÁ SER ENCAMINHADO AO CTA PARA REALIZAÇÃO DA IMUNOGLOBINA (PRAZO DE 7 DIAS PARA INICIAR PROFILAXIA).
	NEGATIVO	POSITIVO	ENCAMINHAR AO CTA PARA AVALIAÇÃO COM INFECTOLOGISTA E ACOMPANHAMENTO
SÍFILIS	POSITIVO	NEGATIVO	REALIZAR PROFILAXIA COM PENICILINA G BENZATINIA 2,4 milhões UI-IM (1,2 milhão em cada glúteo)
	NEGATIVO	POSITIVO	ENCAMINHAR AO CTA PARA AVALIAÇÃO COM INFECTOLOGISTA , TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO

O Esquema Profilático atualmente utilizado para do HIV é:

### ESQUEMA PREFERENCIAL:

**Tenofovir (TDF)300mg/Lamivudina (3TC)300mg 1 cp/dia**

**Dolutegravir (DTG)50mg 1 cp/dia**

Atenção: Evitar o uso de Tenofovir na presença de Insuf. Renal. Dolutegravir não deve ser usado em associação a fenitoína, fenobarbital, oxycarbamazepina, carbamazepina, dofetilida e pilsicainamida. Dolutegravir pode aumentar a concentração plasmática de Metformina.

APÓS RESULTADOS DE EXAMES, E INÍCIO DE PROFILAXIAS (SE NECESSÁRIO) REALIZAR NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO, ENCAMINHAR SERVIDOR AO DIMOP (ANTIGO DEESMT) NO PAÇO OU HMP, PARA CONSULTA COM MÉDICO DO TRABALHO. (Apenas Servidores Estatutários – Terceirizados realizam acompanhamento na Empresa Contratante.) O DIMOP ENCAMINHARÁ O SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO NO CTA, SE NECESSÁRIO E SOLICITARÁ EXAMES PARA O SEGUIMENTO ADEQUADO DOS CASOS.